



COPROCULTURE OU PARASITOLOGIE

- Mettre de préférence une paire de gants à usage unique.
- Recueillir les selles dans un récipient propre de grande taille type bassine, bassin, pot de chambre.
- Ce récipient intermédiaire aura été au préalable soigneusement nettoyé à l'eau savonneuse, ou javellisé puis rincé et parfaitement essuyé.
- Choisir un fragment de selle de la taille d'une noix en s'aidant de la spatule fournie avec le flacon et le transférer dans le flacon stérile fourni par le laboratoire.
- Les parties anormales de la selle (sang, mucus, pus, liquide...) sont choisies préférentiellement.
- Fermer hermétiquement le flacon. Noter les nom et prénom, ainsi que la date et **l'heure du prélèvement**
- Le remettre à l'intérieur la pochette plastique, la fiche de suivi est placée dans la poche extérieure.

✓ **En aucun cas les selles ne seront récupérées dans la cuvette des toilettes.**

- ✓ En cas de diarrhée intermittente, recueillir préférentiellement des selles de consistance non moulées.

RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES

La détection de sang dans les selles est réalisée pour le dépistage précoce du cancer colo-rectal. Le test permet de détecter l'hémoglobine native dans les selles. Cette recherche est fréquemment réalisée sur 3 jours.

Le recueil est réalisé de la même façon que ci-dessus.

L'alcool, l'aspirine ou d'autres médicaments irritants pour l'appareil gastro-intestinal peuvent provoquer des saignements. Leur prise doit être arrêtée au moins 48 heures avant le recueil des selles.

Un brossage des dents trop intensif est déconseillé (risque de saignement au niveau des gencives).

Chez la femme : le recueil de l'échantillon doit être éloigné de plus de 3 jours des périodes menstruelles.

NOUVEAU-NE, BEBE ET PETIT ENFANT

- La couche est apportée au laboratoire, après l'avoir soigneusement refermée, et mise dans un sac plastique. Il n'est pas utile de transférer la selle dans un flacon stérile.
- Le prélèvement est possible par écouvillonnage rectal en utilisant un écouvillon de transport.
- Chez le bébé allant au pot, procéder comme pour un adulte continent.

SUJET INCONTINENT

- Procéder comme pour l'adulte continent en recueillant les selles dans la protection jetable.
- Si les selles sont liquides et absorbées par la protection jetable, alors retirer cette dernière, la fermer hermétiquement, la mettre dans un sac plastique et le transmettre au laboratoire.

PORTEUR D'UNE STOMIE

- Mettre de préférence une paire de gants à usage unique.
- Recueillir les matières fécales dans la poche de stomie, en s'aidant de la spatule fournie avec le flacon si la consistance le permet, sinon déverser le contenu de la poche directement dans le flacon. Il est inutile de remplir le flacon.
- Fermer hermétiquement le flacon. Noter les nom et prénom, ainsi que la date et l'heure du prélèvement

SELLES DE 24H: STEATORRHEE, CREATORRHEE ET ETUDE DE LA DIGESTION

- Le patient doit recueillir la totalité des selles pendant 24H dans un large pot fourni par le laboratoire (ne pas ajouter le papier hygiénique). Si le recueil doit être réalisé sur 2 ou 3 jours, utiliser le même pot.
- Fermer hermétiquement le pot. Noter les nom et prénom, ainsi que la date et l'heure du prélèvement

Le prélèvement sera conservé à température ambiante après émission, et devra être transmis au laboratoire dans les 4 heures. Si ce délai doit être dépassé, il est nécessaire de conserver les selles au réfrigérateur à +4°C (hors recherche d'anguillules); l'acheminement peut alors être reporté jusqu'à 24 heures (voire au 3^{ème} jour pour la recherche de sang dans les selles). Dans le cas de la recherche d'amibes (mentionnée sur l'ordonnance, apporter les selles au laboratoire dans l'heure).

➡ *Compléter la fiche de suivi au dos*

