

LBM INOVIE LxBIO 22 rue Béteille BP 108 12001 RODEZ Cédex

Information patient : Test respiratoire à l'urée

Ref : FE CBP 1010 (07) Version : 07



TEST RESPIRATOIRE A L'UREE (DÉTECTION HELICOBACTER PYLORI)

But du test: Mise en évidence de la présence d'*Helicobacter pylori* dans l'estomac. (Dépistage et contrôle de l'éradication après traitement)

Produits nécessaires : Helicobacter Test INFAI 75 mg

Helicobacter Test INFAI 45 mg (pour enfants 3-11 ans)

HELIKIT (laboratoire Mayoly Spindler)

Il est indispensable avant de venir au laboratoire de se procurer en Pharmacie le kit en présentant la prescription médicale mentionnant « Kit pour test respiratoire à l'urée. Helicobacter pylori » ou « Helikit » ou « test INFAI Helicobacter »

Précautions à respecter avant de se rendre au laboratoire pour la réalisation du test.

- 1- Venir au laboratoire : sujet au repos, à jeun depuis au moins 6 heures (sans boire, ni manger, ni fumer)
- 2- Ne pas avoir pris un traitement **antibiotique** depuis au moins **4 semaines**.
- 3- Ne pas avoir pris de **médicament anti-sécrétoire** depuis au moins **2 semaines**.
 - Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) :

Esoméprazole (Inexium)

Lansoprazole (Lanzor, Ogast, Ogastoro et génériques)

Oméprazole (Mopral , Zoltum , et génériques)
Pantoprazole (Eupantol , Inipomp et génériques)

Rabéprazole (Pariet)

- Et aussi

Cytotec (Misoprostol) Keal (Sucralfate) Ulcar (Sucralfate)

- Anti-H2 (liste non exhaustive)

Stomedine Nizaxid
Azantac Raniplex
Pepciduo Tagamet
Pepcidac Peptidine

4- Ne pas avoir pris de **pansements gastro-intestinaux ou d'antiacides** depuis **24 heures** (liste non exhaustive) :

Digestif Marga Gelusil Isudrine Maalox Moxydar Phosphalugel Rennie Riopan Rocgel Xolaam Bedelix Actapulgite Smecta Bolinan Pepsane Siligaz Acidrine Poly-karaya Contracide Gelox Kaomuth Mutésa Neutroses Polysilane

Gaviscon Gastropulgite

Remarque:

Pendant le déroulement du test, il est nécessaire de rester au laboratoire (repos).